

Инструменты, перевязочные материалы, средства для наружного и местного применения

Салфетки стерильные	герм. упак.	5	
Бинты стерильные 5 и 7 см	упак.	по 1	
Бинты сетчатые № 1–3	упак.	по 1	
Лейкопластырь 3 см	рулон	1	
Ножницы	шт.	1	
Термометр	шт.	1	
Лейкопластырь (полоски)	шт.	5	
Палочки ватные	шт.	20	
Хлоргексидин 0,05% р-р	флакон 100 мл	1	Для обработки ран, ожогов, полоскания горла
Бальзам «Спасатель»	туба 30 г	1	Для лечения ран, ожогов, мозолей, фурункулов, при укусах
Стрепсилс плюс	таблетки	8	При болях в горле рассасывать каждые 2–3 ч, но не более 8 табл. в сутки, не более 5 дней
Ингалипт	спрей (флакон)	1	При заболеваниях горла, рините, стоматите. Орошать полость рта, горло 1–2 с или брызгать в нос 3–4 раза в сутки
Соль пищевая		50 г	Для полоскания горла 1 полная щепотка на 100 мл воды

Желудочно-кишечные препараты

Лоперамид	капсулы по 2 мг	10	При диарее 2 капс. однократно, затем по 1 капс. после каждого акта жидкой дефекации. Высшая суточная доза 8 капс.
Смекта	порошок по 3 г	6	При отравлениях, диарее, изжоге 1 пак. на 100–150 мл (на 1/2 дня)

Противовирусные препараты

Ингавирин	капсулы по 90 мг	7	При ОРЗ, гриппе по одной капсуле в сутки независимо от приема пищи 5–7 дней
-----------	------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------

Нестероидные противовоспалительные препараты

Спазмолгон	таблетки по 0,5 г	10	Болеутоляющее. Однократно 1 табл. Высшая разовая доза 1 г, суточная 3 г
Нимесил	порошок по 100 мг	6	Болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспалительное. Растворить 1 пак. в 100 мл воды, принимать 2 раза в сутки

Прочее

Нитроглицерин	таблетки по 0,5 мг	40	Для купирования приступов стенокардии, 1 табл. под язык, в случае отсутствия эффекта — еще 1 табл. через 5 мин
Витамин С растворимый	таблетки по 1 г	5	Для повышения иммунитета 1 табл. на 200 мл 1 раз в сутки