

Наименование	Ед. изм.	Осн.	Опер.	Способ применения и дозы
Инструменты, перевязочные материалы, средства для наружного и местного применения				
Салфетки стерильные	шт.	5		
Салфетки спиртовые	шт.	5	3	
Бинт стерильный 7 см	шт.		1	
Бинт стерильный 10 см	шт.	1		
Бинты сетчатые № 1–3	шт.	по 1		
Лейкопластырь 3 см	рулон	1		
Лейкопластырь (полоски)	шт.		5	
Ножницы	шт.	1		
Пилка для ногтей, бритвочка	шт.		1+1	
Термометр	шт.	1		
Палочки ватные	шт.	50		
Линимент синтомицина 10%	туба	1		Для лечения ссадин, ран, ожогов, мозолей
Р-р бриллиантового зелен.	каранд.	1		Для обработки мелких порезов и ссадин
Бальзам Караваева (Витаон)	флакон	1		Капли в нос; для лечения ран, ожогов, полоскания горла
«Доктор Мом»	банка	1		Местнораздражающая мазь
Бепантен	туба	1		Для лечения ран, ожогов, опрелостей
Лизобакт	таб.	26	4	При болях в горле, стоматите рассасывать по 2 табл. 3–4 раза в сутки, долго удерживая раствор в полости рта
Соль пищевая		50 г		Для полоскания горла 1 полная щепотка на 100 мл воды
Желудочно-кишечные препараты				
Лоперамид	капс.	10		При диарее 2 капс. однократно, затем по 1 капс. после каждого акта жидкой дефекации. Высшая суточная доза 8 капс.
Смекта	пак.	5	1	При отравлениях, диарее, изжоге 1 пак. на 100–150 мл Принимать вне приема пищи по 3 пакетика в день 3–7 дней
Противовирусные и иммуностимулирующие препараты				
Ингавирин	капс.	7		При ОРЗ, гриппе по одной капсуле в сутки независимо от приема пищи 5–7 дней
Эхинацея (иммунал)	таб.	16	4	Для повышения иммунитета 3–4 раза в сутки 1 нед.
Нестероидные противовоспалительные препараты				
Спазмолгон	таб. по 0,5 г	10	2	Болеутоляющее. Однократно 1 табл. Высшая разовая доза 1 г, суточная 3 г
Колдакт	капс.	4		Для купирования симптомов ОРЗ. По 1 капс. 2 раза в сутки, не более трех суток
Кетанов	таб.	8	2	Болеутоляющее. По 1 табл. до 4 раз в сут., не дольше 5 сут.
Прочее				
Нитроглицерин	таб. по 0,5 мг		40	Для купирования приступов стенокардии, 1 табл. под язык, в случае отсутствия эффекта — еще 1 табл. через 5 мин
Асепта-бальзам	туба	1		Местно при стоматите и других заболеваниях полости рта
Покупается в аптеке при необходимости				
Ингалипт	спрей	1		При заболеваниях горла, рините, стоматите. Орошать полость рта, горло 1–2 с или брызгать в нос 3–4 раза в сутки
Гевискон (суспензия)	флакон	1		При изжоге, болях в желудке по 1 ст. ложке на ночь
Альфа-нормикс (рифаксимин)	таб. по 0,2 г	24		При кишечных инфекциях по 2 табл. 2 раза в день 6 дн.
Гепабене	капс.	30		При болях в печени 1 капс. во время еды 3 раза в день, при необходимости дополнительно 1 капсулу перед сном
Диклофенак 5%	туба	1		Нестероидный противовоспалительный препарат; местно